

L'élevage des chats

Par Marc Crastucci Juge Int FIFe - Eleveur sous l'affixe Petrera

marc.crastucci@petrera.fr

Pour une majorité de personne, le chat est une espèce qui se reproduit facilement, qui s'occupent de leurs chatons avec aisances, que ces derniers ont une croissance sans difficultés...En réalité il en est tout autrement. Malgré une surveillance accrue du couple reproducteur et un contrôle sérieux de son environnement, la production de chatons de races présente des difficultés.

En effet des générations de domestication n'empêche pas que la chatte puisse souffrir des conditions artificielles qui lui sont faites durant la conception, la gestation ou la mise bas. La future maman peut se montrer rebelle à l'accouplement, connaître une gestation pénible et subir une mise bas douloureuse.

Il arrive aussi que dès la naissance d'autres problèmes se posent. La femelle peut manquer de lait, produire un lait acide, rejeter ses petits, les transporter fébrilement d'un endroit à l'autre.....

Je vais essayer de vous présenter les connaissances indispensables à avoir lorsque l'on souhaite élever des chats de races. De dresser les besoins psychologiques du male étalon et de la femelle, ce qui peut arriver au différent stade de la grossesse et de la naissance et ce qu'il convient de faire si les choses tournent mal.

Sommaire :

La chatte	La chatte reproductrice	La mise bas
Surveillance à apporter aux accouplements	Table de gestation	Elever des chatons au biberon
Le male étalon	La chatte en gestation	L'élevage des chatons

La chatte

HAUT



GIC MEGANE SWEET
FLAME DE LA PETRERA

Une femelle peut être achetée à partir de l'âge de trois mois mais si vous avez la possibilité d'acquérir une femelle plus âgée qui a déjà fait ses preuves en concours cela sera très bien. Mais avant toute chose il faudra s'assurer de la perfection de son pedigree, de son inscription au registre qui convient et de la mise à jour de son carnet de santé. De veiller à ce que tous les tests ont bien été pratiqués (FeIV, PKD....). Elle doit être saine et sans parasites.

Un débutant a tout intérêt à intégrer un club de race, ou un groupe d'éleveur, de suivre si il en a la possibilité des formations comme le CETAC. Les expositions félines sont de bonnes occasions de rencontres avec les éleveurs.

La jeune femelle peut mener une vie normale en famille, à la condition d'être extrêmement vigilant afin qu'elle ne sorte pas dehors, à moins de disposer d'un espace clos et protégé (ce qui est un idéal). Elle ne doit pas avoir de contact avec d'autre chat, autre que ceux de l'élevage et ce pour éviter toute contamination.

Elle a besoin d'un régime alimentaire équilibré, de jeux pour se maintenir en forme, et d'un toilettage quotidien qui renforcera d'autant plus les liens qu'elle aura avec vous.

La période de chaleur, ou oestrus, peut se produire dès l'âge de 4 mois. Elle ne survient en principe que vers l'âge de 9 mois chez les Siamois et les Orientaux et souvent au-delà chez les Persans.

Durant cette période il faut soigneusement enfermée la femelle dans la maison et l'observer. Lorsque vous saurez reconnaître dès les premiers signes annonciateur du cycle et que vous aurez étudié son comportement

vous serez plus à même de prévoir les oestrus suivant. Vous pourrez vous y prendre à l'avance la prochaine fois. Notamment si vous devez prévoir une saillie avec un male extérieur à votre chatterie.

Certaines chattes ont une maturité précoce et leurs chaleurs se répètent toutes les trois ou quatre semaines, dès les tous premiers mois. Elles risquent alors de perdre l'appétit et leur développement physique s'en trouvera gravement perturbé, durant cette période délicate que représente la croissance.

Demandez toujours l'avis de votre vétérinaire, qui préconise la plus part du temps un accouplement. En effet des oestrus trop fréquents peuvent compromettre la santé de la chatte, voire engendrer une stérilité. Dans ce cas la gestation ne pourra que contribuer à son épanouissement, à la condition qu'elle bénéficie d'une alimentation et de soins adaptés à cette phase de sa vie.

Le male étalon

HAUT

La femelle joue un rôle important, mais le rôle du male l'est d'avantage. En effet il est la colonne vertébrale d'un élevage étant donné qu'il va saillir toutes les femelles. Il sera à l'origine de beaucoup de chatons, c'est pour cela qu'il doit être un excellent représentant de sa race et répondre aussi fidèlement que possible aux standards.

Il doit avoir été convenablement élevé, provenir d'une portée n'ayant subi aucun traumatisme de quelque nature que se soit.

Pour s'occuper de façon satisfaisante d'un male, il faut de l'expérience et de la compréhension. En effet, la vie d'un étalon ne se limite pas à la reproduction. En dehors des « visites » des femelles, il demande beaucoup d'affection et de soins. Son installation doit être agréable et spacieuse, lui permettant de faire beaucoup d'exercice et de se prélasser au soleil.



GIC BRYN MAWR
PRETTY BOY FLOYD OF
PETRERA

Il est bon d'entourer l'habitation du mâle d'un enclos de plein air agréable et solidement grillagé. Pour le sol, le carrelage ou le béton sont préférables à la pelouse, qui est impossible à nettoyer et à désinfecter. La construction d'un abri extérieur offre au chat un refuge en cas d'intempéries. L'installation de grosses bûches, d'échelles de bois...offrira à notre matou la possibilité d'exercer ses extraordinaires talents de grimpeur.

Un male choisi pour étalon sera proposé au certificat d'aptitude au championnat (CAC) afin de prouver sa qualité. Il pourra, par la suite devenir Champion, Champion International, Grand Champion International ou Champion d'Europe.

Pour obtenir un male adulte puissant et en bonne santé, il faut lui fournir une alimentation et des soins très étudiés, veiller à lui faire subir les vaccins indispensables, lui donner régulièrement des vermifuges, examiner une fois par semaine ses dents, ses oreilles et ses griffes. On doit s'assurer aussi par des examens réguliers, qu'il est indemne de toute infection.


Lorsque le male reproducteur est moins sollicité, mieux vaut le faire castrer plutôt que de le laisser sombrer dans une inactivité frustrante. Il pourra alors jouir d'une retraite bien méritée.

Surveillance à apporter aux accouplements

HAUT

Pour ses premiers accouplements, on propose au male, des femelles calmes et expérimentées. Pour un éleveur débutant, l'accouplement est un spectacle assez terrifiant : certaines femelles attaquent sauvagement le male qui doit avoir le réflexe d'échapper aux griffes de la furie. Avec l'âge, les réactions de la femelle s'atténuent. Elle continue de gronder et de cracher, mais ses coups de griffes ne sont plus aussi violents.

Il est important que les premières saillies se fassent sous une étroite surveillance, on évitera ainsi les blessures tant morales que physiques.



GIC KIRLU CASCADE OF
PETRERA

L'arrivée de la femelle doit se faire dans le calme et la douceur. Il vaut mieux la mettre dans une cage pour qu'elle fasse connaissance « tranquillement » avec son étalon. Dans la mesure du possible, mieux vaut enfermer le male durant l'installation de la femelle : il risque de manifester sa sympathie par des jets d'urine bien dirigés !

Une fois la femelle installée dans une cage, le male lui voue un intérêt passionné. Qu'importent les protestations furieuses de la belle, puisque un grillage le met à l'abri de ses griffes et de ses dents. Il est conseillé de proposer un repas substantiel avant l'arrivée de la chatte, car jusqu'au moment où il parviendra à s'accoupler avec elle, il refusera souvent de se nourrir.

Un temps plus ou moins long peut s'écouler, avant que la femelle se montre prête à s'accoupler. Cela peut demander trente six heures pour une chatte inexpérimentée et moins d'une heure pour une femelle plus mure. A ce stade, la femelle cesse de cracher et de grogner pour répondre par des appels pathétiques aux cris d'encouragement du male.

Avant de libérer la femelle, il est recommandé d'étaler une couverture sur le sol et de fermer la porte de la pièce. Les males habitués à la pose de cette couverture la reconnaissent et en comprennent l'implication. La porte fermée limite l'espace dans lequel la femelle a tendance à courir en tous sens pour essayer d'échapper à l'étreinte du male. Quand à la couverture, elle lui fournit un endroit confortable pour se rouler et pour s'agripper au moment de l'accouplement. Pendant les ébats amoureux, l'éleveur ne doit pas intervenir. La saillie achevée, l'étalon s'écarte de sa partenaire et se réfugie dans son abri. Avant de soumettre la femelle à un nouvel accouplement, il faut la laisser récupérer dans sa cage.

La femelle doit être présentée au male les deuxièmes ou troisièmes jours des chaleurs. Après deux ou trois accouplements les chats doivent être séparés et remis ensemble le lendemain. Et ce pendant trois ou quatre jours. Après la femelle doit être retirée.


L'accouplement déclenche le processus d'ovulation et sa répétition multiplie les chances de succès.

Lorsque la chatte retourne dans « ses appartements », il faut continuer à être extrêmement vigilant, l'oestrus n'est pas terminé. Il faut donc continuer à prendre les mêmes précautions qu'avant la mise au male.

Il faut veiller à ce que la femelle soit toujours bien verminuger, faite le avant l'apparition des chaleurs.

La chatte reproductrice

HAUT



IC LILI DE LA PETRERA

Une chatte peut avoir des portées jusqu'à 9 /10 ans à la condition d'avoir bénéficié de soins attentifs, et des portées espacées. Une portée par an à partir de 10 mois. La lactation fatigue beaucoup les femelles et peut entraîner des carences graves en calcium.

L'éleveur doit donc veiller à ce que l'alimentation de l'animal en comporte sous une forme facilement assimilable : votre vétérinaire est la seule personne compétente pour prescrire la dose de calcium dont la femelle a besoin.

Sans avoir de période de rut fixe, la chatte a tendance à mettre bas d'avantage au printemps, au milieu de l'été et au début de l'automne. Maintenant enfermée dans des lieux longuement éclairés par la lumière électrique, une chatte procréée plus souvent qu'une autre élevée dans une chatterie où l'on suit le rythme normal de la lumière solaire. Les chatons nés au printemps et en été sont plus faciles à élever et plus robustes que les autres. Ils bénéficient d'un ensoleillement excellent pour leur développement.

La chatte ne doit être présentée à l'étalon que le deuxième ou troisième jour de l'oestrus. Il faut durant ce temps, la tenir soigneusement enfermée. Elles essaient toujours de sortir, sans forcément parvenir à s'accoupler avec le premier male venu, mais elle risque d'attraper n'importe quel parasite et pire n'importe quelle infection.

Certaines femelles ont des périodes de chaleur régulières et espacées, tandis que d'autres paraissent en continuel état de rut. C'est un phénomène plus fréquent chez les colourpoint et les Orientaux que chez les poils courts.

D'autres chattes montrent le désir étrange de s'accoupler à nouveau, alors qu'elles sont, de façon certaine et parfois visible, déjà pleines depuis quatre semaines. Une légende, sans aucun fondement scientifique, prétend que ce le second accouplement favorise le processus de la mise bas, puis de la lactation. Il vaut mieux en rire quand on entend cela, la vérité c'est que l'on ignore pourquoi certaines femelles adoptent ce comportement.

Parfois, les chaleurs apparaissent aussitôt après la naissance des petits. Pourtant la chatte n'est pas en mesure de s'accoupler : en allaitant, elle dégage des odeurs particulières qui éloignent en principe les males. Cependant,

si un accouplement à quand même lieu à ce moment il n'entraîne pas forcément (et même pratiquement jamais) une nouvelle gestation. Un équilibre hormonal semble empêcher l'implantation de l'ovule fécondé.

Table de Gestation

HAUT

Cette table permet de calculer la date probable de la naissance des chatons. Repérez la date de l'accouplement, puis lisez la date indiquée au dessous. Par exemple, si l'accouplement a eu lieu le 1er avril, les chatons devraient naître le 5 juin.

JANVIER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
	MARS																												AVRIL		
FEVRIER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4			
	AVRIL																												MAI		
MARS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
	MAI																												JUIN		
AVRIL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	
	JUIN																												JUILLET		
MAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
	JUILLET																												AOUT		
JUIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
	AOUT																												SEPTEMBRE		
JUILLET	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
	SEPTEMBRE																												OCTOBRE		
AOUT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
	OCTOBRE																												NOVEMBRE		
SEPTEMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	
	NOVEMBRE																												DECEMBRE		
OCTOBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
	DECEMBRE																												JANVIER		
NOVEMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
	JANVIER																												FEVRIER		
DECEMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6
	FEVRIER																												MARS		

La chatte en gestation

HAUT

On ne peut, avec certitude, affirmer que la chatte a été fécondée. L'examen des tétines peut aider à y voir plus clair. Elles apparaissent du jour au lendemain, vers le 24ème jour après la fécondation, légèrement plus grosses et d'un rose vif.

Pendant la gestation, il faut traiter l'animal comme d'habitude, sans faire toute une histoire de ce phénomène, après tout naturel. Les chattes trop gâtées font des mères anxieuses, allant jusqu'à refuser de nettoyer et de nourrir leur petits sans l'aide et l'assistance de leur maître.

L'état d'angoisse dans lequel elles vivent les amène à produire un lait acide, nocif pour la portée. Elles peuvent également transporter fébrilement leurs chatons d'un endroit à un autre, au risque de les blesser.

Une chatte normale, équilibrée et traitée avec naturel vit sa gestation, sa mise bas et sa maternité sans problèmes particuliers. Ses petits se montreront à leur tour normaux, sains, plein de vie, heureux de vivre.

Je vais essayer de vous présenter, d'une facons la plus synthétique possible, les changements d'apparence, de comportement de la femelle au cours de ses 9 semaines de gestations, et des traitements qu'il convient de faire au cours des ces semaines.

	APPARENCE	COMPORTEMENT	TRAITEMENT
1ere, 2ième et 3eme semaine	Des plus normale, sans modification du volume abdominal. Vers le 24 ième jour les tétines deviennent roses et gonflent	Des plus normal, la chatte se comporte comme d'habitude	Rien changer au comportement avec elle, il faut lui donner des repas digeste et nourrissants. Si elle a de la température, qu'elle semble apathique et manque d'appétit, consulter sans attendre le vétérinaire.
4ième semaine	Son abdomen devient légèrement ballonné, seul le vétérinaire peut à la palpations sentir les embryons. Si c'est examen est fait par un novice, il risque d'occasionner des dommages irréversibles	Elle est calme et détendu, parfois elles dorment plus que d'ordinaire.	Pas de traitement spécifique, si ce n'est un toilettage minutieux, et être attentif au moindre signe. Vous devez veiller à ce qu'elle ne développe aucune maladie et à ce qu'elle n'est aucun parasite. Il ne faut utiliser aucun produit anti parasitaire ni antifogique sur une femelle gestante.
5ième semaine	Son abdomen est visiblement gonflé, on s'en rend très bien compte qu'elle soit en mouvement ou au repos. Ses tétines sont visiblement gonflées	C'est la pleinitude total, la chatte est calme et détendue	Même traitement que ceux ennoncés pour la 4 ième semaine, continuer les toilettage minutieux. Donner un repas supplémentaire riche en proteines.
6 ième semaine	Sa silhouette ne laisse plus aucun doute sur son état.	La chatte fait moins d'exercise, elle se montre prudente, son appétit augmente.	Un apport en calcium est indispensable. Donner lui du lait de chèvre (pas de lait de vache), du fromage en pate mole neutre (sans parfum) type "Kiri" ou "Vache qui rit". Encourager la à jouer, mais aucun jeux violent ni épuissants.
7 ième semaine	On voit et on sent les chatons bouger dans le ventre.	Elle a l'air de communiquer avec ses chaton a grand coup de ronron, elle se roule, rampe sur le sol et commence à chercher des endroits à son gout pour la mise bas.	Trois repas par jour sont maintenant nécessaire, avec un apport en sel minéraux et en vitamines. Il existe dans le commerce des produits spécifiques et idéalement dosés. Continuer le toilettage quotidien et minutieux. Mettez à sa disposition une grand caisse de carton remplie de papier qu'elle s'amusera à déchirer pour faire son nid. Vous pouvez déjà placé des coussins chauffant ou des plaques chauffantes que vous trouverez en magasin spécialisé. Ils procureront à la portée une douce chaleur. Vous pouvez bien sur utiliser des caisse de mise bas vendu en magasin spécialisé, mais la boite en carton est tres bon marché, et surtout vous pouvez la remplacer facilement si elle est souillée. Il faut impérativement limité la propagation des infections éventuelles et êtres extremement rigoureux sur l'hygiène.
8 et 9 ième semaine	L'abdomen se durcit et prend la forme d'une poire, ses tétines sont très gonflées, on remarque	La chatte se prelasse, passe de long moment à se lécher, surtout les tétines, elle devient	Continuer le toilettage quotidien, montrer lui tout votre affection.

	<p>parfois surtout sur les femelles de couleur de robe sombre l'apparition de petites péllicules, il n'y a rien d'inquietant à cela.</p>	<p>très caline, elle va et vient de sa caisse et à l'air de "s'amuser" à déchirer les papier dans sa caisse.</p> <p>Quelques jours avant la mise bas sa voix peut changé, j'ai observé cela surtout chez les colourpoint.</p> <p>Juste avant la mise bas, la plus part des femelles refusent toutes nourriture, elles se levent et se recouchent sans cesse pour essayer de trouver une position plus confortable.</p> <p>Quand la mise bas est vraiment proche elles n'arretent pas d'aller leurs litières.</p>	<p>Il faut lui assurer 4 petits repas très nourrissants, enrichis de vitamines et de sels minéraux, il faut variés les repas et lui proposés ses aliments préférée.</p> <p>Si la chatte est trop ronde pour se nettoyer ses parties génitales, il faut la nettoyer avec un savon spécifique de type Gyn Hydralin. Il faut lui nettoyer cette zone chaque jour avec de l'eau tiède, la sècher doucement puis la talquer.</p> <p>Verifier l'état des tétines, si elles sont désséchées il lui masser avec de l'huile végétale. Ne mettez aucun produit parfumé ou autre. Il faut couper les poils autour des tétines à l'aide d'un ciseaux à bout rond.</p> <p>Personnellement je rase mes femelles mais ne faite pas cela si vous n'avez pas d'expérience vous risqueriez des les blésées. Faites de même autout de la région génitale.</p> <p>Vérifiez la propreté des oreilles et l'état des dents.</p> <p>Montrez votre femelle à un vétérinaire avant la mise bas pour s'assurer que tout se passe parfaitement bien.</p> <p>Quand la mise bas arrive, vider la caisse des papier, etaler des serviettes propre (il faut en prévoir plusieurs). Et veiller à garder une litière extremement propre.</p>
--	--	--	--

La mise bas

HAUT

Premier stade du travail :

Lorsque le travail commence, la température de la chatte (normalement comprise entre 38 et 38.6°C) passe de 38.6 à 37.2°C. On peut observer alors deux types de comportement :

Celui de la chatte anxieuse, qui arpentera la pièce, gémira, grognera, vomira, ne s'arrêtant pas d'aller et venir dans leur litière...que cela ne vous inquiète pas il s'agit là d'un comportement normal.

Et l'autre, celui d'une chatte plus paisibles et reste allongées en ronronnant et pétrissant leur couche de leurs pattes avant.

De légèr contraction font onduler les flancs de la chatte tandis que le premier chaton passe, de la trompe utérine, dans l'utérus. On observe des ruptures dans le rythme de la respiration qui la font haleter, grogner ou trembler. Ce premier stade peut durer jusqu'à 24heures

Deuxième stade :

Là encore deux comportements sont observés. Les chattes qui montrent que la présence de leur maître leur est indispensable, et d'autre qui préfèrent resté seul dans l'obscurité, dans ce cas vous viendrez discrètement de temps en temps vous assurer que tout se déroule normalement.

Alors que le premier chaton progresse, les contractions deviennent plus violentes. D'abord espacées d'une demi heure, elles se produisent toutes les trente secondes, juste avant la mise bas. Les chatons peuvent naître très rapidement ou très lentement. La mère profite de ce répit pour retirer la poche amniotique, couper le cordon et avaler le placenta. J'ai pris l'habitude de donner entre chaque chaton du Nutrical à mes femelles (2 cm du produit appliquer sur mon doigts et coller sur le palais de la femelle). Si le placenta est « normal » (c'est-à-dire de belle couleur et de texture normal) de le couper aux ciseaux et de le donné à la femelle. Il contient une hormone, l'ocytocine, extrêmement importante qui favorise la montée de lait nous y reviendrons plus tard sur le rôle de cette hormone.

Vous devez laisser faire la femelle, mais être extrêmement vigilant en vous assurant que les voies respiratoires du chaton sont bien dégagées et qu'il respire bien. Vous devez vous assurer également que le placenta a bien été expulsé.

Naissance normale sans assistance

La chatte n'a pas besoin de l'éleveur, il est même condamnable le fait que l'éleveur intervienne systématiquement. La nature est bien faite et votre femelle aura beaucoup plus « d'instinct » que vous. Votre rôle est de rester attentif au bon déroulement des choses et de n'intervenir que lorsque un souci se présente. Notamment si les petits arrivent trop vite et que la mère n'ait pas de temps de bien s'en occuper.

La mise bas en trois étapes :

1 – Les contractions de la chatte entraînent peu à peu l'expulsion des chatons. La chatte les aide à sortir en les léchant. Le chaton naît mouillé par le liquide amniotique, enveloppé du sac fœtal transparent, rattaché au placenta par le cordon ombilical.

2 – La chatte retire à grand coup de langue énergique la membrane recouvrant la face du chaton. Le petit cambre le dos pour se dégager. Son nez et sa bouche libérés, il prend sa première respiration. La maman avale les débris du sac amniotique, puis mâchonne le cordon ombilical afin de se délivrer du placenta. Dès que celui-ci est expulsé elle le mange.

3 – Enfin pour terminer, elle nettoie entièrement le chaton avec sa langue, puis elle coupe le cordon ombilical au ras du corps du chaton (je reviendrais plus tard sur un accouchement assisté, mais il ne faut jamais couper au ras du corps le cordon quand vous le faites aux ciseaux). Le chaton stimulé par sa maman, et après tant d'effort rampe vers son corps chaud et recherche déjà les tétines. La mère recommence à avoir ses contractions et se prépare pour le prochain chaton.

Naissance avec assistance de l'éleveur

Votre pharmacie doit contenir :

- des petits carrés d'éponges stérilisés et rangés dans une boîte plastique
- un flacon d'antiseptique de type « bétadine jaune »
- des ciseaux à bout rond rangés dans une boîte en plastique
- du coton hydrophile
- des rouleaux de papier absorbant
- une bouillotte d'eau chaude, ou une plaque ou un tapis chauffant « spécial élevage »
- Des sachets poubelles où vous jetterez au fur et à mesure toutes les souillures.